

Подготовка пищеварительного тракта к колоноскопии

Имя пациента: _____

Дата: ____/____/____ Время: ____ утра / дня

Место: _____

Внимание: прежде чем приступить к выполнению описанных ниже действий, обратитесь к врачу за рецептом препарата TriLyte® с вкусовым наполнителем (PEG-3350: хлорид натрия, бикарбонат натрия и хлорид калия, для приема внутрь в виде раствора) со вкусовым наполнителем (лимон-лайм, цитрус-лесные ягоды, вишня, ананас, апельсин)

Подготовка за день до процедуры:

Утром:

- Выберите пакетик препарата по вкусу и высыпьте содержимое в четырехлитровую емкость. Тщательно потрясите емкость, чтобы должным образом перемешать вкусовой наполнитель и порошок.
- Залейте воду до нужной отметки и вновь тщательно потрясите, пока порошок не растворится.
- Храните раствор в холодильнике до употребления.
- В случае приема каких-либо препаратов проконсультируйтесь у лечащего врача на предмет изменения их дозировки.
- На завтрак съешьте что-нибудь легкое.

Днем:

- Откажитесь от приема тяжелой пищи до момента окончания процедуры. Пить разрешается только прозрачные жидкости – воду, бульон, кисель (кроме красного и малинового), спортивный напиток Gatorade (кроме красного и малинового).

Вечером:

- Приступите к приему раствора между 4 часами дня и 6 часами вечера. Выпивайте стакан раствора емкостью 8 унций (250 г) каждые 10 минут. Рекомендуется выпивать стакан быстро, а не мелкими глотками.
- Продолжайте пить раствор каждые 10 минут до тех пор, пока не опорожните всю емкость либо до появления жидкого и бесцветного стула.
- Кишечник начнет опорожняться спустя час после приема первого стакана раствора. Опорожнение кишечника продолжится в течение нескольких часов после приема последнего стакана.
- После приема первых стаканов может появиться ощущение вздутия живота, переполнения желудка и тошноты. Эти ощущения кратковременны и обычно исчезают с появлением стула.
- Не следует принимать тяжелую пищу. Разрешается пить воду и другие прозрачные жидкости, рекомендованные лечащим врачом.

Подготовка: день проведения колоноскопии:

Вас обязательно должен сопровождать кто-нибудь из друзей или родственников, чтобы довести и/или помочь добраться домой.

Вам разрешен прием медикаментов, за исключением тех ситуаций, когда это не рекомендовано врачом.

(Ознакомьтесь с подробными указаниями по применению препарата TriLyte® с вкусовым наполнителем)